

DERMATITE DEL BAGNANTE

Cos'è la dermatite del bagnante?

La dermatite del bagnante, nota anche come dermatite da cercarie, si manifesta con un esantema allergico causato da parassiti che in ambiente acquatico possono attaccare uccelli (anatre, cigni, oche, gabbiani) e mammiferi (castori e topi muschiati). Le larve di questi microscopici parassiti vengono liberate in acque dolci o salate (laghi, stagni, mare) da lumache infette. Invece di parassitare gli animali che fungono generalmente da ospiti, come gli uccelli acquatici, le cercarie possono anche penetrare nella pelle di bagnanti, provocando reazioni allergiche. La dermatite del bagnante è presente in tutto il mondo, e si manifesta con maggiore frequenza durante i mesi estivi


Come giungono in acqua i parassiti?

I parassiti adulti vivono nel sangue degli animali ospiti infetti. I parassiti producono uova che vengono evacuate dagli animali infetti tramite le deiezioni. Le uova evacuate si schiudono rilasciando piccole larve che nuotano liberamente nell'acqua, alla ricerca di lumache acquatiche da parassitare. All'interno di queste ultime le larve si sviluppano diventando cercarie (da dove l'espressione «dermatite da cercarie») per poi essere nuovamente evacuate nell'acqua.

Le cercarie quindi cercano un ospite definitivo adeguato (p.es. un uccello acquatico), in modo da concludere il ciclo e riinziarlo da capo.

Anche se gli esseri umani non possono effettivamente fungere da ospiti definitivi, accade che le cercarie penetrino nella pelle di bagnanti provocando una reazione allergica, senza tuttavia poter penetrare all'interno dell'organismo umano e muoiono rapidamente.

Ciclo vitale dell'agente patogeno della dermatite del bagnante



(© prof. Wilfried Haas, Università di Erlangen)

Quali sono i sintomi tipici della dermatite del bagnante?

I sintomi della dermatite del bagnante possono essere molto fastidiosi per le persone colpite ma di regola non costituiscono un serio pericolo per la salute.

I i sintomi più frequenti sono:

- pizzicori, pruriti e bruciori sulla pelle;
- piccole pustole rosse;
- piccole vesciche.

I pizzicori, pruriti e bruciori sulla pelle possono manifestarsi già subito dopo essere entrati in contatto con l'acqua o anche svariati giorni dopo. Le piccole pustole rosse si manifestano nell'arco di 12 ore e possono trasformarsi in piccole vesciche. In alcuni casi il prurito può durare una settimana o più, per poi scomparire progressivamente.

Occorre consultare un medico?

Nella maggior parte dei casi non sono necessarie cure mediche. Le persone colpite possono trovare sollievo adottando le misure seguenti, eventualmente dopo aver consultato un farmacista:

- coprire le parti di pelle colpite con compresse fredde;
- applicare un gel o una lozione contro il prurito;
- trattare la pelle con una pomata contenente corticosteroidi venduta senza ricetta;
- in caso di prurito molto forte si possono assumere antistaminici orali

Benché sia difficile, bisognerebbe evitare di grattarsi, dato che in tal modo la pelle interessata potrebbe infettarsi.

Se, in rari casi, dovessero insorgere reazioni allergiche molto forti come vertigini, diaforesi, febbre o nausea, occorre consultare un medico, il quale può prescrivere medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione.

La dermatite del bagnante può essere trasmessa da persona a persona?

No

Chi rischia di essere affetto dalla dermatite del bagnante?

Tutte le persone che nuotano o s'immergono in acque in cui vi sono cercarie sono esposte a un certo rischio. Le cercarie si trovano per lo più in acque basse in vicinanza della riva. I bambini sono colpiti più di frequente che gli adulti, dato che si soffermano soprattutto laddove l'acqua è poco profonda; inoltre, usciti dal lago, si asciugano meno sovente con l'asciugamano rispetto agli adulti.

Le acque infestate rimangono per sempre insicure?

No. Perché la dermatite del bagnante diventi un problema devono concorrere svariati fattori. Dato che questi fattori si modificano, a volte nell'arco di una stessa stagione balneare, i problemi legati alla presenza delle cercarie possono scomparire a loro volta. Tuttavia è difficile pronosticare in anticipo lo stato dell'acqua. Dopo essere state evacuate dalle lumache, le cercarie sopravvivono ancora per circa 24 ore. Tuttavia, una lumaca parassitata evacua larve per tutta la vita. Affinché la generazione seguente di lumache sia parassitata, sono necessari animali ospiti nella regione, che però non sono sempre presenti nella medesima proporzione (p.es. uccelli migratori).

Com'è possibile ridurre il rischio di essere affetti dalla dermatite del bagnante?

Le seguenti misure hanno un effetto preventivo:

- dopo essere usciti dall'acqua fare la doccia, asciugare subito e con vigore il corpo con un asciugamano e, se possibile, togliere il costume da bagno;
- nelle zone balneari non attirare uccelli con il mangime.